

Vragenlijst Vasa Previa t.b.v. onderzoek door de Vasa Previa Foundation

De VPF wil graag meer inzicht krijgen in de beleving en ervaringen in de dagelijkse praktijk van medische professionals op het gebied van vasa previa. Hiervoor vragen we uw medewerking.

1. Wat is uw beroep?

- a. Verloskundige
- b. Gynaecoloog
- c. Echoscopist
- d. Huisarts
- e. Verpleegkundige
- f. Anders namelijk: _____

2. Hoe lang oefent u dit beroep reeds uit? _____ jaren

3. Op welke manier(en) bent u bekend met vasa previa? (meerdere antwoorden mogelijk)

- Ik weet niet wat vasa previa is (ga verder met vraag 11)
- Ik heb tijdens mijn opleiding onderwijs genoten over vasa previa
- Ik heb tijdens mijn beroepsuitvoering van dichtbij met vasa previa te maken gehad.
- Ik heb via een collega te maken gehad met vasa previa
- Anders, namelijk: _____

4. Hoe vaak heeft u te maken gehad met vasa previa?

- a. Zelf meegemaakt tijdens een bevalling: _____
- b. Via een collega erover gehoord: _____

5. Kunt u iets vertellen over uw ervaring(en):

(als u meer ruimte nodig hebt, kunt u hiervoor de laatste pagina van deze vragenlijst gebruiken)

6. Bent u bekend met de risicogroepen voor vasa previa?

- a. Ja, de risicogroepen zijn:
- b. Niet exact, ik ken de volgende risicogroepen: _____
- c. Nee (ga verder met vraag 8)

7. Controleert u vrouwen uit deze risicogroepen middels een echo op velamenteuze navelstrenginsertie, of laat u ze controleren?

- a. Ja
- b. Nee
- c. Anders, namelijk: _____

8. Uit onderzoek¹ blijkt dat Vasa Previa eens op de 2500 zwangerschappen voorkomt. Een verloskundige of gynaecoloog zou dan, uitgaande van 150 bevallingen per jaar en een loopbaan van 25 jaar, 1 of 2 maal tijdens de loopbaan vasa previa meemaken. Herkent u dit aantal?

- a. Ja, dat klopt wel ongeveer
- b. Nee, het zijn er naar mijn ervaring meer
- c. Nee, het zijn er naar mijn ervaring minder
- d. Anders, namelijk: _____
- e. Weet niet/geen mening

Z.O.Z.

9. **Velamenteuze navelstrenginsertie komt volgens onderzoek voor bij 1-2% ² van alle zwangerschappen. Bij meerlingzwangerschappen ligt dit percentage op 15% ³, bij drielingzwangerschappen zelfs op 28,2% ⁴. Herkent u deze percentages?**
- Ja, dat klopt wel ongeveer
 - Nee, het zijn er naar mijn ervaring meer
 - Nee, het zijn er naar mijn ervaring minder
 - Anders, namelijk: _____
 - Weet niet/geen mening
10. **Volgens onderzoek⁵ is bij een niet tijdig (voor de bevalling) gediagnosticeerde vasa previa de kans op overleven van de baby kleiner dan 50%. Herkent u dit percentage?**
- Ja, dat klopt wel ongeveer
 - Nee, het zijn er naar mijn ervaring meer
 - Nee, het zijn er naar mijn ervaring minder
 - Anders, namelijk: _____
 - Weet niet/geen mening

Bent u verloskundige/gynaecoloog/huisarts? Ga door naar vraag 11
Bent u echoscopist/radioloog? Ga door naar vraag 15
Bent geen van beiden? Ga door naar vraag 17

Specifieke vragen voor verloskundige/gynaecoloog/huisarts

11. **Welke actie onderneemt u indien een zwangere (3^e trimester) u belt over het feit dat ze veel bloed heeft verloren?**
- Ik stel haar gerust: bloedverlies is heel normaal en kan ook heftig zijn, als het maar niet te lang aanhoudt
 - Ik ga meteen langs om poolshoogte te nemen
 - Ik draag haar op met spoed naar het ziekenhuis te gaan voor de zekerheid
 - Anders, namelijk: _____
12. **Breekt u de vliezen wel eens kunstmatig bij een vrouw tijdens de bevalling?**
- Ja, regelmatig, zo gaat de bevalling sneller
 - Ja, maar pas nadat ik de vliezen zorgvuldig onderzocht heb op onregelmatigheden
 - Nee, dit is onnatuurlijk en onnodig
 - Anders, namelijk: _____
13. **Na de geboorte dient er een registratieformulier ingevuld te worden over de bevalling. Als er sprake is van velamenteuze navelstrenginsertie/vasa previa, noteert u dit dan op het registratieformulier?**
- Ja, altijd
 - Alleen als dit complicaties tot gevolg heeft gehad
 - Nee, daar is geen ruimte voor
 - Nee, dat is niet de bedoeling van de registratie
 - Anders, namelijk _____
14. **Gebruikt u bij een thuisbevalling een amnioscoop om te zien of er vaten door de vliezen lopen?**
- Ja, altijd
 - Ja, alleen als ik het vermoeden heb dat er bloedvaten overheen lopen
 - Nee, dat voel ik beter tijdens het touché
 - Nee, dit is via een amnioscoop niet waar te nemen
 - Nee, ik heb niet de beschikking over een amnioscoop
 - Anders, namelijk _____

Ga door naar vraag 17

Specifieke vragen voor echoscopist/radioloog:

15. De controle op de navelstrenginsertie is als Optioneel opgenomen in de richtlijn voor de 20 weken echo. Voert u deze controle uit tijdens de 20 weken echo?

- Ik kijk altijd naar het punt waar de navelstreng in de placenta inserreert
- Alleen bij specifieke gevallen zoals: _____
- Nee, dit is meestal heel moeilijk te zien
- Nee, de check is optioneel dus ik doe het niet.
- Anders, namelijk _____

16. Hoeveel tijd kost het om de navelstrenginsertie te controleren?

- Minder dan een minuut
- 1-5 minuten
- 5-10 minuten
- Langer, namelijk: _____

Ga door naar vraag 17

17. Kent u de Vasa Previa Foundation?

- Ja, ik heb er wel eens van gehoord
- Ja, ik weet ook waar ze voor staan
- Nee, nog nooit van gehoord
- Anders, namelijk: _____

18. Bent u bereid de Vasa Previa Foundation te helpen hun doelen te bereiken?

- Ja, ik wil graag helpen, neem contact met mij op. Mijn gegevens:
Naam: _____ emailadres: _____ telefoonnummer: _____
(uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor dit doeleinde)
- Ik heb momenteel weinig tijd maar wellicht in de toekomst.
- Nee, hoewel ik ondersteun wat de stichting doet heb ik er geen tijd voor
- Nee, ik sta niet achter haar missie
- Anders, namelijk: _____

19. Hebt u tips/adviezen voor de Vasa Previa Foundation?

(als u meer ruimte nodig hebt, kunt u hiervoor de laatste pagina van deze vragenlijst gebruiken)

Als u op de hoogte wilt worden gehouden over de activiteiten van de Vasa Previa Foundation vult u hieronder uw e-mailadres in.

O Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden. Mijn emailadres is: _____

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!

U kunt de uitgeprinte vragenlijst opsturen naar: Vasa Previa Foundation, Kleine Weide 2, 6097 DD Heel.

Bronvermeldingen:

- Oyelese KO, Turner M, Lees CG, Campbell S. Vasa previa: an avoidable obstetric tragedy. *Obstet Gynaecol Surv* 1999;54:138-45
- Benirschke K, Kaufmann P. *Pathology of the Human Placenta*. New York, NY: Springer-Verlag, 2000; 353-359.
- Malinowski W. Umbilical cord complications in twin pregnancies *Ginekol Pol.* 2003 Oct;74(10):1208-12
- Feldman DM, Borgida AF e.o. Clinical implications of velamentous cord insertion in triplet gestations. *Am J Obstet Gynecol.* 2002 Apr;186(4):809-11
- J.V. Collea, MD, K.M. Lewis, MD, Y. Oyelese, MBBS Cover Story: Vasa previa: Are most perinatal deaths preventable? *Contemporary OB/GYN* Nov 1, 2003